

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 26-3-68 764927

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLÉMENT N° 2 AU BULLETIN N° 90 de MARS 1968

1e 25 MARS 1968

V I G N E

INFORMATIONS

Acariose de la vigne -

Les traitements les plus efficaces contre ce parasite sont ceux effectués en prédébourrement.

Une pulvérisation copieuse doit être réalisée :

- soit 20 jours avant le débourrement avec une bouillie à base d'huile d'anthracène
- soit juste avant le débourrement (stade B "bourgeons dans le coton")

avec : - une bouillie sulfocalcique ou des soufres micronisés
- un oleoparathion ou un oleomalathion

Ces derniers produits sont également actifs contre l'érinose.

Cochenilles -

Les traitements huileux énumérés ci-dessus sont également doués d'un certain pouvoir de destruction vis à vis de ces parasites.

A R B R E S F R U I T I E R S

AVERTISSEMENT

Tavelure du poirier

Il est recommandé d'effectuer un traitement sur les variétés ayant atteint le stade C³ ; en effet les rameaux porteurs de pustules chancreuses de tavelure ont la possibilité d'émettre dès maintenant leurs conidies.

L'emploi d'un produit cuprique à la dose de 250 g. de cuivre métal est à préférer pour ce traitement.

Rappelons que les variétés de poiriers les plus sensibles à la Tavelure sont : Beurré Hardy, Beurré d'Hardenpont, Louise Bonne, Beurré Diel, Beurré Giffard, Doyenné d'hiver ...

P. 236

INFORMATIONS

Pommiers et autres rosacées -

Le traitement de prédébourrement doit se poursuivre pour se terminer dans les jours à venir.

Maladie des pochettes du prunier -

Cette maladie qui déforme les fruits sévit dans nos régions. Une intervention entre le débourrement et le stade bouton blanc à l'aide d'une spécialité fongicide organo-cuprique ou organique est recommandée.

GRANDE CULTURE

INFORMATION

Gros charançon de la tige du colza -

Des conditions climatiques particulièrement défavorables ont fréquemment gêné la réalisation du traitement conseillé par notre avis du 14 mars.

Depuis, et malgré des températures relativement basses, le charançon de la tige s'est révélé actif dans les secteurs où des dommages ont été constatés l'année dernière.

Si une intervention contre ce parasite présente encore à l'heure actuelle un certain intérêt, elle ne saurait éviter totalement les dégâts mais seulement les atténuer.

D'autre part, il est rappelé que si des traitements limités aux bordures sont, à la rigueur, valables en début d'invasion, compte-tenu de la dispersion de ce charançon dans les cultures, ils ne peuvent être envisagés maintenant.

DIVERS

Anthracnose du saule -

Depuis trois ans, l'anthracnose affecte sérieusement les saules, en particulier les saules pleureurs. Pour éviter cette affection ou en réduire la gravité, il convient d'appliquer sur les arbres une pulvérisation d'une bouillie à base de manèbe à 200 g. de matière active par hectolitre, dès à présent, traitement à renouveler à deux reprises à une quinzaine de jours d'intervalle.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire "CHAMPAGNE"